Materiał informacyjny dla hodowców drobiu

Postępowanie z drobiem w okresie upałów

Praktyczne zasady ograniczające stres cieplny i śmiertelność w stadzie

Wysoka temperatura otoczenia (powyżej 27–30°C) to jedno z najpoważniejszych zagrożeń w produkcji drobiarskiej.

Drób nie poci się i trudno oddaje nadmiar ciepła — stres cieplny prowadzi do spadku nieśności i przyrostów, osłabienia odporności, a w skrajnych przypadkach do masowych upadków.

WODA — DOSTĘP BEZ OGRANICZEŃ

- Zapewnij stały dostęp do świeżej, chłodnej wody — zapotrzebowanie wzrasta nawet 2 – 4-krotnie.
- Sprawdzaj poidła kilka razy dziennie - w upały uzupełniaj wodę częściej.
- Zacieniaj przewody i zbiorniki z wodą, aby nie nagrzewała się w rurach.

WENTYLACJA I MIKROKLIMAT

- Zwiększ wydajność wentylacji — usuwaj nadmiar ciepła i wilgoci z budynku.
- Stosuj systemy zraszania / chłodzenia adiabatycznego (mgiełkowanie) tam, gdzie to możliwe.
- Otwieraj kurtyny/okna w najchłodniejszych porach doby (wcześnie rano, wieczorem, w nocy).
- Ogranicz nasłonecznienie budynków — zacienienie, malowanie dachów na jasny kolor.
- Monitoruj temperaturę i wilgotność w kilku punktach kurnika, nie tylko przy czujniku centralnym.

KARMIENIE I OBSADA STADA

- Przesuń główne karmienie na godziny chłodniejsze — wczesny ranek i późny wieczór.
- Ogranicz zadawanie paszy w szczycie upału (najwyższe temp. zwykle 12:00–17:00).
- Rozważ czasowe zmniejszenie gęstości obsady, aby ułatwić rozpraszanie ciepła.
- Stosuj pasze o wyższej gęstości energetycznej i dobrej strawności — ograniczają produkcję ciepła metabolicznego.

TRANSPORT I PRZEŁADUNEK

- Planuj transport na godziny nocne lub wczesnoranne, unikaj przewozu w największym upale.
- Zapewnij odpowiednią wentylację środków transportu i nie przekraczaj dopuszczalnej obsady klatek.
- Skracaj czas oczekiwania na załadunek i wyładunek, zapewnij cień w miejscu postoju.
- Ograniczaj niepotrzebny stres i hałas — dodatkowo podnoszą temperaturę ciała ptaków.

⚠ OBJAWY PRZEGRZANIA — NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

- Intensywne dyszenie, otwarty dziób
- Rozłożone skrzydła, unikanie kontaktu
- Ograniczona aktywność, apatia
- Gromadzenie się przy poidłach
- Spadek pobrania paszy i nieśności
- Nagły wzrost upadków w stadzie

USUWANIE PADŁYCH PTAKÓW

- Padłe ptaki usuwaj z kurnika niezwłocznie, co najmniej kilka razy dziennie w okresie upałów.
- Nie dopuszczaj do gromadzenia się zwłok — rozkład w wysokiej temperaturze zwiększa ryzyko sanitarne i szerzenia chorób.
- Zwłoki przechowuj krótkotrwale w wyznaczonym, zacienionym/chłodzonym miejscu, niedostępnym dla zwierząt.
- Zawrzyj umowę z zakładem utylizacyjnym, zapewniającą regularny i szybki odbiór padłych ptaków.

W razie zauważenia objawów przegrzania stada:

1. Natychmiast zwiększ wentylację i podaj chłodną wodę.
2. Zmniejsz zagęszczenie ptaków, jeśli to możliwe.
3. Skontaktuj się z lekarzem weterynarii nadzorującym stado.

Materiał informacyjny — dostosuj zalecenia do warunków własnego gospodarstwa i konsultuj z lekarzem weterynarii